

带状疱疹（アラセナ）

★ 投与前に必ずチェックする事項

- (禁忌) ペントスタチン、コホリン投与中
- (慎重) アロプリノール（ザイロリック等）投与中
- (慎重) 骨髄移植後など、骨髄機能抑制がある
- (慎重) 膠原病の患者

バリエーション
(有り ・ 無し)

患者名

指示医署名

担当医署名

担当看護師署名

日数	1 (入院)	2	3	4	5	6 (退院)
日付	/			/		/
達成目標	痛みの軽減	→				退院基準：日常生活を妨げる程の痛みがない、皮疹がほぼ痂皮化
内服	<input type="checkbox"/> 内服開始 <input type="checkbox"/> ロルフェナミン <input type="checkbox"/> メコバラミン <input type="checkbox"/> ムコスタ 3T分3後 6日分	<input type="checkbox"/> 内服継続	<input type="checkbox"/> 内服継続	<input type="checkbox"/> 内服継続	<input type="checkbox"/> 内服継続	→
点滴	<input type="checkbox"/> 点滴開始 <input type="checkbox"/> アラセナ 1V 生食 (300 ・ 400 ・ 500)mL 1日1回 (2 ・ 3)時間でdiv.	<input type="checkbox"/> 点滴継続	<input type="checkbox"/> 点滴継続	<input type="checkbox"/> 点滴継続	<input type="checkbox"/> 点滴継続	終了後、抜針
<div style="background-color: yellow; padding: 5px;"> 【 調剤上の注意！ 】 溶けにくいお薬です。 まず生食10mLをアラセナのバイアルに入れて、バイアルを15秒間よく振り混ぜてください。 その後、バイアルの内容液を生食500mLのバッグに戻し、よく振り混ぜてください。 透視して、溶けきっていない結晶がないか確認してから使ってください。 </div>						
軟膏処置	<input type="checkbox"/> 水疱：アラセナ 1日1回外用し、ガーゼ保護	<input type="checkbox"/> 痂皮：ゲンタシン	→			
約束指示	<input type="checkbox"/> 疼痛時 レクトス (25) レクトス (50) <input type="checkbox"/> キソニン1T	<input type="checkbox"/> 発熱時38.5度以上 レクトス (25) レクトス (50) <input type="checkbox"/> キソニン1T	<input type="checkbox"/> 血圧上昇時 200/100以上で アダラート1T <input type="checkbox"/> 不眠時 レンドルミン1T	<input type="checkbox"/> 持参薬 有り		<input type="checkbox"/> 退院時処方
検査	<input type="checkbox"/> 便秘時 プルゼニド1T <input type="checkbox"/> 探血 <input type="checkbox"/> 胸部Xp <input type="checkbox"/> 心電図	<input type="checkbox"/> 探尿		<input type="checkbox"/> 持参薬 無し		
活動・安静度	<input type="checkbox"/> 制限無し					
栄養	<input type="checkbox"/> 普通食	<input type="checkbox"/> () 食、	() kcal	<input type="checkbox"/>		
清潔	<input type="checkbox"/> 清拭 洗髪	<input type="checkbox"/> シャワー浴		<input type="checkbox"/>		
排泄	<input type="checkbox"/> フリー	基礎疾患があれば、	それに準ずる	<input type="checkbox"/>		
教育・指導	入院時オリエンテーション、入院治療計画書、服薬指導					退院療養計画書、服薬指導