

医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 基準値一覧

2024/08/01現在

	基準値		単位			基準値		単位		
	男性	女性				男性	女性			
	下限 ～ 上限	下限 ～ 上限				下限 ～ 上限	下限 ～ 上限			
T-Bil(T-BIL)	0.4 ～ 1.2		性別差設定なし	mg/dL	血液一般	白血球	4 ～ 8	性別差設定なし	×10 ³ /μL	
D-Bil(D-BIL)	0.0 ～ 0.5		〃	mg/dL		赤血球	4.20 ～ 5.20	3.70 ～ 4.70	×10 ⁶ /μL	
AST(GOP)	5 ～ 35		〃	U/L		ヘモグロビン	13.5 ～ 17.5	11.5 ～ 15.5	g/dL	
ALT(GPT)	1 ～ 40		〃	U/L		ヘマトクリット	40.0 ～ 50.0	35.0 ～ 45.0	%	
ALP	38 ～ 113		〃	U/L		血小板	150 ～ 350	性別差設定なし	×10 ³ /μL	
γ-GT(γ-GTP)	6 ～ 64		2 ～ 40	U/L		MCV	87.0 ～ 97.0	85.0 ～ 95.0	fL	
ChE(CHE)	213 ～ 501		性別差設定なし	U/L		MCH	27.0 ～ 34.5	性別差設定なし	pg	
LD(LDH)	124 ～ 222		〃	U/L		MCHC	30.0 ～ 36.0	〃	%	
LAP	31 ～ 60		27 ～ 45	U/L	網赤血球		0.2 ～ 2.0	〃	%	
AMY(血清)	40 ～ 125		性別差設定なし	U/L	血液像	Neutro(機械像)	46.0 ～ 60.0	〃	%	
UN(BUN)	8 ～ 20		〃	mg/dL		St(目視像)	3.0 ～ 7.0	〃	%	
CRE	0.40 ～ 1.10		〃	mg/dL		Seg(目視像)	42.0 ～ 53.0	〃	%	
UA	3.7 ～ 7.6		2.5 ～ 5.4	mg/dL		Ly	32.0 ～ 48.0	〃	%	
Na	135 ～ 147		性別差設定なし	mEq/L		Mo	3.0 ～ 7.0	〃	%	
K	3.5 ～ 4.6		〃	mEq/L		Eo	1.0 ～ 5.0	〃	%	
Cl	96 ～ 108		〃	mEq/L		Ba	0.0 ～ 2	〃	%	
Ca	8.8 ～ 11.0		〃	mg/dL	PT	基準値設定なし		秒		
IP	2.7 ～ 4.4		〃	mg/dL	INR	0.90 ～ 1.30	〃	/		
Mg	1.5 ～ 2.4		〃	mg/dL	PT活性値	80.0 ～ 130.0	〃	%		
Glu(血糖)	70 ～ 110		〃	mg/dL	APTT	24.0 ～ 39.0	〃	秒		
リパーゼ	6 ～ 48		〃	IU/L	尿定性	PH	5.0 ～ 7.0	〃	/	
T-Cho(T-CHO)	140 ～ 220		〃	mg/dL		Pro半量	—	〃	/	
TG	32 ～ 150		〃	mg/dL		糖半定量	—	〃	/	
HDL-CHO	41 ～ 86		41 ～ 96	mg/dL		KET	—	〃	/	
LDL-CHO	70 ～ 139		性別差設定なし	mg/dL		BIL	—	〃	/	
CK(CPK)	24 ～ 195		24 ～ 170	U/L		BLD	—	〃	/	
CK-MB	1 ～ 25		1 ～ 25	U/L		URO	N	〃	/	
トロポニン I	19.9 ～ 32.4	12.1 ～ 21.9	pg/mL	WBC		—	〃	/		
Fe	80 ～ 200		70 ～ 179	μg/L	比重	1.005 ～ 1.030	〃	/		
TIBC	235 ～ 410		225 ～ 389	μg/L	CRE(尿)	基準値設定なし		〃	/	
UIBC	155 ～ 210		性別差設定なし	μg/L	尿中アルブミン U-ALB換算値	0 ～ 10	性別差設定なし	mg/g・CRE		
TP	6.5 ～ 8.2		〃	g/dL	蛋白定量(部分尿)		10以下	〃	mg/dL	
ALB(血清)	4.1 ～ 5.1		〃	g/dL	尿沈渣	赤血球-U	基準値設定なし		〃	/
A/G	1.1 ～ 1.8		〃	/		白血球-U	基準値設定なし		〃	/
CRP	0.24以下		〃	mg/dL		扁平上皮	基準値設定なし		〃	/
e-GFR	60以上		〃	mL/分/1.73m ²		移行上皮	基準値設定なし		〃	/
BNP(院内)	18.4以下		〃	pg/mL		細菌	(-)		〃	/
HbA1c(NGSP)	4.6 ～ 6.2		〃	%	便潜血	免疫法1	0 ～ 100	〃	ng/mL	
インスリン	1.84 ～ 12.2		〃	μIU/mL		免疫法2	0 ～ 100	〃	ng/mL	
C-ペプチド(CPR)	0.61 ～ 2.09		〃	ng/mL	HCG	有経女性/閉経後女性	遊離HCG-β	1.0未満	ng/mL	
葉酸	4.0以上		〃	ng/mL		有経女性/閉経後女性	CLEIA法	2.7以下	mIU/mL	
ビタミンB12	180 ～ 914		〃	pg/mL		健常人男性	2.7以下	性別差設定なし	mIU/mL	
						部分尿	0.7以下		mIU/mL	
					髄液一般	細胞数	0 ～ 5	〃	/μL	
						糖(髄液)	50 ～ 75	〃	mg/dL	
						蛋白(髄液)	10 ～ 40	〃	mg/dL	
						Cl	120 ～ 125	〃	mEq/L	