

医療法人社団洛和会 洛和会音羽リハビリテーション病院 基準値一覧

2025/04/01現在

	基準値		単位			基準値		単位	
	男性	女性				男性	女性		
	下限 ～ 上限	下限 ～ 上限				下限 ～ 上限	下限 ～ 上限		
T-Bil(T-BIL)	0.4 ～ 1.2	性別差設定なし	mg/dL	血液一般	白血球	4 ～ 8	性別差設定なし	×10 ³ /μL	
D-Bil(D-BIL)	0 ～ 0.5	〃	mg/dL		赤血球	4.20 ～ 5.20	3.70 ～ 4.70	×10 ⁶ /μL	
AST(GOP)	5 ～ 35	〃	U/L		ヘモグロビン	13.5 ～ 17.5	11.5 ～ 15.5	g/dL	
ALT(GPT)	1 ～ 40	〃	U/L		ヘマトクリット	40 ～ 50	35 ～ 45	%	
ALP	38 ～ 113	〃	U/L		血小板	150 ～ 350	性別差設定なし	×10 ³ /μL	
γ-GT(γ-GTP)	6 ～ 64	2 ～ 40	U/L		MCV	87 ～ 97	85 ～ 95	fL	
ChE(CHE)	213 ～ 501	性別差設定なし	U/L		MCH	27 ～ 34.5	性別差設定なし	pg	
LD(LDH)	124 ～ 222	〃	U/L		MCHC	30 ～ 36	〃	%	
LAP	31 ～ 60	27 ～ 45	U/L	網赤血球		0.2 ～ 2	〃	%	
AMY(血清)	40 ～ 125	性別差設定なし	U/L	血液像	Neutro(機械像)	46 ～ 60	〃	%	
UN(BUN)	8 ～ 20	〃	mg/dL		St(目視像)	3.0 ～ 7.0	〃	%	
CRE	0.4 ～ 1.1	〃	mg/dL		Seg(目視像)	42 ～ 53	〃	%	
UA	3.7 ～ 7.6	2.5 ～ 5.4	mg/dL		Ly	32 ～ 48	〃	%	
Na	135 ～ 147	性別差設定なし	mEq/L		Mo	3 ～ 7	〃	%	
K	3.5 ～ 4.6	〃	mEq/L		Eo	1 ～ 5	〃	%	
Cl	96 ～ 108	〃	mEq/L		Ba	0 ～ 2	〃	%	
Ca	8.8 ～ 11	〃	mg/dL	PT		基準値設定なし		秒	
IP	2.7 ～ 4.4	〃	mg/dL	INR		0.9 ～ 1.3	〃	/	
Mg	1.5 ～ 2.4	〃	mg/dL	PT活性値		80 ～ 130	〃	%	
Glu(血糖)	70 ～ 110	〃	mg/dL	APTT		24 ～ 39	〃	秒	
リパーゼ	6 ～ 48	〃	U/L	尿定性	PH	5 ～ 7	〃	/	
T-Cho(T-CHO)	140 ～ 220	〃	mg/dL		Pro半量	—	〃	/	
TG	32 ～ 150	〃	mg/dL		糖半定量	—	〃	/	
HDL-CHO	41 ～ 86	41 ～ 96	mg/dL		KET	—	〃	/	
LDL-CHO	70 ～ 139	性別差設定なし	mg/dL		BIL	—	〃	/	
CK(CPK)	24 ～ 195	24 ～ 170	U/L		BLD	—	〃	/	
CK-MB	1 ～ 25	1 ～ 25	U/L		URO	N	〃	/	
トロポニン I	19.9 ～ 32.4	12.1 ～ 21.9	ng/mL		WBC	—	〃	/	
Fe	80 ～ 200	70 ～ 179	μg/L	比重	1.005 ～ 1.030	〃	/		
TIBC	235 ～ 410	225 ～ 389	μg/L	CRE(尿)		基準値設定なし	基準値設定なし	/	
UIBC	155 ～ 210	性別差設定なし	μg/L	尿中アルブミン U-ALB換算値		0 ～ 10	性別差設定なし	mg/g・CRE	
TP	6.5 ～ 8.2	〃	g/dL	蛋白定量(部分尿)		10以下	〃	mg/dL	
ALB(血清)	4.1 ～ 5.1	〃	g/dL	尿沈渣	赤血球-U	基準値設定なし	〃	/	
A/G	1.1 ～ 1.8	〃	/		白血球-U	基準値設定なし	〃	/	
CRP	0.24以下	〃	mg/dL		扁平上皮	基準値設定なし	〃	/	
e-GFR	60以上	〃	mL/分/1.73m ²		移行上皮	基準値設定なし	〃	/	
BNP(院内)	18.4以下	〃	pg/mL		細菌	(-)	〃	/	
HbA1c(NGSP)	4.6 ～ 6.2	〃	%	便潜血	免疫法1	100 未満	〃	ng/mL	
インスリン	1.84 ～ 12.2	〃	μIU/mL		免疫法2	100 未満	〃	ng/mL	
C-ペプチド(CPR)	0.61 ～ 2.09	〃	ng/mL	HCG	有経女性/閉経後女性	遊離HCG-β	1.0未満	ng/mL	
葉酸	4.0以上	〃	ng/mL		有経女性/閉経後女性	CLEIA法	2.7以下	mIU/mL	
ビタミンB12	180 ～ 914	〃	pg/mL		健常人男性	2.7以下			mIU/mL
FSH(男性)	2 ～ 8.30		mIU/mL	部分尿	0.7以下	性別差設定なし			mIU/mL
FSH(女性:卵胞期)			3.01 ～ 14.72	mIU/mL	髄液一般	細胞数	0 ～ 5	〃	/μL
FSH(女性:排卵期)			3.21 ～ 16.6	mIU/mL		糖(髄液)	50 ～ 75	〃	mg/dL
FSH(女性:黄体期)			1.47 ～ 8.49	mIU/mL		蛋白(髄液)	10 ～ 40	〃	mg/dL
FSH(女性:閉経後)		157.79以下	mIU/mL	Cl		120 ～ 125	〃	mEq/L	