

## 膵がん・胆道がん

療法名	薬剤名	投与量	施行日	投与期間
GEM	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	1,8,15	4週間
GC	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	1,8	3週間
	CDDP	25mg/m <sup>2</sup>	1,8	
S-1+GEM	S-1	体表面積で用量設定あり	1~14	3週間
	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	1,8	
S-1+GEM(術前補助化学療法)	S-1	体表面積で用量設定あり	1~14	3週間
	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	1,8	
nab-PTX+GEM	nab-PTX	125mg/m <sup>2</sup>	1,8,15	4週間
	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	1,8,15	
オニバイド+5-FU+I-LV	オニバイド	70mg/m <sup>2</sup>	1	2週間
	I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	1	
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup> (持続)	1~2	
FOLFIRINOX	L-OHP	85mg/m <sup>2</sup>	1	2週間
	I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	1	
	CPT-11	150mg/m <sup>2</sup>	1	
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup> (ポーラス)	1	
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup> (持続)	1~2	
Pembrolizumab	Pembrolizumab	200mg	1	3週間
Durvalumab+GC	Durvalumab	1500mg/body <sup>※</sup> ※体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg	1	3週間 最大8コース終了後 Durvalumab維持療法へ
	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	1,8	
	CDDP	25mg/m <sup>2</sup>	1,8	
Durvalumab(維持療法)	Durvalumab	1500mg/body <sup>※</sup> ※体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg	1	4週間